

Инструкция

**По приготовлению и применению рабочего раствора средством «ДезХлор» из таблеток массой (3,25-3,45) для обработки кухонной, столовой посуды, столовых приборов, подносов, кухонного инвентаря, предметов для мытья посуды,
составлена на основе постановления от 28.01.2021 г № 4 СанПин 3.36.86.21.**

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	5л	10л	20л
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4

Режимы дезинфекции раствором «ДезХлор»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Посуда без остатков пищи.	0, 015	15	Погружение (замачивание)
Предметы для мытья посуды (губки, ерши и др.)	0, 030	30	Погружение (замачивание)

- Раствор готовят в эмалированных (без повреждения эмали), стеклянных и пластмассовых емкостях путем растворения соответствующего количества таблеток водопроводной питьевой воды комнатной температуры.
- Рабочие растворы средства для дезинфекции посуды без остатков пищи можно использовать многократно в течение рабочей смены, если внешний вид раствора не изменился. При появлении первых признаков изменения внешнего вида (изменение цвета, помутнение раствора и т.п.) раствор необходимо заменить.
- Посуду освободить от остатков пищи и полностью погрузить в раствор на 15 мин, закрыв крышкой.
- Промыть посуду с помощью щёток и ершей.
- После истечения экспозиционной выдержки посуду промыть в проточной воде до исчезновения запаха хлора.
- Высушить посуду.
- Предметы для мытья посуды (губки, ерши и др.) погружают в раствор средства.
- По окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

Утверждаю:
директор школы
_____ Е.В.Тарабанова

Инструкция
по приготовлению и применению рабочего раствора «ДЕЗХЛОР»
для обработки оборудования, производственных столов, стеллажей, полов, стен, дверей,
подоконников, ручек дверей, составлена на основе санитарных правил СП 3.36.86.21 от
28.01.2021г. №4.

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	5л	10л	20л
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4

Режимы дезинфекции раствором средства «ДезХлор»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности производственных столов, стеллажей, полов, стен, дверей, ручек дверей и др.	0, 015	60	Протирание или орошение
	0, 030	30	
Уборочный инвентарь (ветошь, тряпки, щетки)	0,030	30	Погружение (замачивание)

- Обработать поверхности ветошью, смоченной в растворе
- После экспозиционной выдержки в течение положенного времени, промыть чистой водой и вытереть насухо.
- Уборочный инвентарь (ветошь, тряпки, щетки, ерши) замачивают (погружают) в рабочем растворе средства в емкости.
- По окончании дезинфекции его прополаскивают и высушивают.

Утверждаю:

Инструкция
по приготовлению и применению рабочего раствора «ДЕЗХЛОР»
для обработки парт, стульев, стеллажей, полов, стен, дверей, подоконников,
ручек дверей, составлена на основе санитарных правил СП 3.36.86.21 от
28.01.2021г. №4.

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	5л	10л	20л
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4

Режимы дезинфекции раствором средства «ДезХлор»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхности в помещениях, жесткая мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов и т.д.	0,015	60	Протирание или орошение
	0,030	30	
Уборочный инвентарь (ветошь, тряпки, щетки)	0,030	30	Погружение (замачивание)

- Обработать поверхности ветошью, смоченной в растворе.
- После экспозиционной выдержки в течение 30 мин, промыть чистой водой и вытереть насухо.
- Уборочный инвентарь замачивают в растворе средства или протирают ветошью, смоченной в растворе, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

Инструкция
по приготовлению и применению рабочего раствора «ДЕЗХЛОР»
для обработки спортивного инвентаря, составлена на основе санитарных правил
СП 3.36.86.21 от 28.01.2021г. №4.

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	5л	10л	20л
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4

Режимы дезинфекции раствором средства «ДезХлор»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Спортивный инвентарь	0,015	45	Погружение или орошение
Уборочный инвентарь (ветошь, тряпки, щетки)	0,030	30	Погружение (замачивание)

- Спортивный инвентарь протирают ветошью, смоченной в растворе средства, или полностью погружают в дезинфицирующий раствор.
- Обработать поверхности ветошью, смоченной в растворе.
- После экспозиционной выдержки в течение положенного времени, промыть чистой водой и вытереть насухо.
- Уборочный инвентарь замачивают в растворе средства или протирают ветошью, смоченной в растворе, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

Утверждаю:
директор школы

Инструкция
по приготовлению и применению рабочего раствора «ДЕО-ХЛОР» для
обработки раковин и унитазов, составлена на основе санитарных правил СП
3.36.86.21 от 28.01.2021г. №4.

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	5л	10л	20л
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4
0,060	2	4	8

Режимы дезинфекции раствором средства «ДезХлор»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Обработка раковин и унитазов	0,060	30	Обработка поверхности щеткой, ершиком
Уборочный инвентарь (ветошь, тряпки, щетки, ершик.)	0,030	30	Погружение (замачивание)

- Обработать поверхности с помощью щётки или ерша способом протирания.
- После экспозиционной выдержки в течение положенного времени, промыть чистой водой.
- Уборочный инвентарь замачивают в растворе средства или протирают ветошью, смоченной в растворе, по окончании дезинфекции прополаскивают и высушивают.

Утверждаю:
директор школы

**Инструкция
по приготовлению и применению рабочего раствора «ДЕЗХЛОР»
для обработки поверхности скорлупы яиц, составлена на основе санитарных
правил СП 3.36.86.21 от 28.01.2021г. №4.**

Концентрация рабочего раствора по АХ, (%)	Количество таблеток (шт.), необходимых для приготовления рабочего раствора (л)		
	5л	10л	20л
0,015	-	1	2
0,030	1	2	4

Режимы дезинфекции раствором средства «ДезХлор»

Объекты обеззараживания	Концентрация рабочего раствора по активному хлору (АХ), %	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Поверхность скорлупы яиц	0, 030	10	Погружение, орошение

- Очистка яиц с загрязненной скорлупой проводится моющими средствами.
- Скорлупу яиц очищают щетками с последующим ополаскиванием проточной водой и замачивают в рабочем растворе средства на время экспозиции.
- Яйца, без видимых загрязнений скорлупы замачивают в рабочем растворе средства в течение 10 минут.
- Обработанные яйца ополаскивают проточной водой до исчезновения запаха хлора.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при приготовлении и применении рабочего раствора «ДЕЗХЛОР»

К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к хлорсодержащим препаратам.

При приготовлении рабочих растворов средства до 0,3% концентрации не требуется применение средств индивидуальной защиты.

Работы с 0,015% растворами по активному хлору способом протирания можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов.

Работы с 0,03–0,06% растворами по активному хлору не требуют использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, но работы следует проводить в отсутствие пациентов.

Работы с растворами средства от 0,1% по активному хлору и выше способами орошения и протирания необходимо проводить с защитой органов дыхания универсальными респираторами типа «РУ-60М» или «РПГ-67» с патроном марки «В» и глаз – герметичными очками. Обработку следует проводить в отсутствие пациентов. Обработанные помещения проветривают не менее 15 мин. до исчезновения запаха хлора.

Все работы с растворами средства следует проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.

Емкости с рабочими растворами для дезинфекции изделий медицинского назначения, предметов ухода за больными, белья, посуды, игрушек, выделений, уборочного материала должны иметь крышки и быть плотно закрыты. Посуду и белье после дезинфекции промывают водой до исчезновения запаха хлора. Изделия медицинского назначения из разных материалов промывают под проточной водой в течение 5 минут. Средство следует хранить в темном прохладном месте, недоступном детям, отдельно от лекарственных препаратов

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

При несоблюдении мер предосторожности возможно острое раздражение органов дыхания (першение в горле, кашель, обильные выделения из носа, учащенное дыхание) и слизистых оболочек глаз (слезотечение, резь и зуд в глазах), может наблюдаться головная боль.

При появлении первых признаков острого раздражения дыхательных путей необходимо выйти на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение, прополоскать горло, рот, нос, выпить теплое питье или молоко.

При необходимости обратиться к врачу.

При попадании средства на кожу смыть его под проточной водой.

При попадании средства в глаза следует промыть их под проточной водой в течение нескольких минут. При раздражении слизистых оболочек закапать глаза 20% или 30% раствор сульфацил-натрия.

При попадании средства в желудок дать выпить пострадавшему несколько стаканов воды с 10–20 измельченными таблетками активированного угля.

При необходимости обратиться к врачу.

Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее $\frac{2}{3}$ объема, промываются раствором моющего средства. Пищевые отходы не допускается выносить через раздаточные или производственные помещения пищеблока.

